


## 地址

我們的地址是：

**#110, 2891 Sunridge Way NE  
Calgary, Alberta  
T1Y7K7**



本診所旁設有停車場。

公共巴士路線：# 19和# 119

距離最近的輕鐵站：卡加利東北 Rundle 站

## 隱私政策

我們將按照《健康資訊法案》的規定收集、使用和披露您所提供的個人健康資訊。

您的個人健康資訊亦會被用作為您提供診斷、治療與護理服務，以及向您所享用的省級醫療計畫發送醫療服務帳單。如欲瞭解更多資訊，請致電 403-571-8640。

Cantonese / MPI: 2013.07.31

## 什麼是心肌灌注顯像 (MPI/鈹) 負荷測試

該測試結合核素心肌灌注顯像負荷測試，檢查患者休息和負荷狀態下血液流向心肌的情況。

### 檢查是怎樣進行的？

到達中心後，中心人員會要求您填寫一份資訊表並閱讀一份同意書。進入檢查室後，醫務人員會向您講解測試內容，屆時您可以提出任何問題或疑問，得到解答後再決定同意進行測試。之後您會開始接受靜脈注射，並進行測試準備，以便我們可以在測試過程中對您的心電圖、心率、節律、血壓等進行全程監測。如果您的耐受時間不足、有相關病史或者心電圖顯示不適合進行踏車運動，您可能需要服用一種叫做雙嘍達莫（潘生丁）的藥物。這方面具體情況要看主治醫生與您溝通後所作的決定。

在接近完成測試的時候，會在您的靜脈血管內注入一種放射性物質-鈹。然後，您需要在醫用相機下方躺下約 15 分鐘，以攝影您的心臟圖片。

負荷圖片完成後，您會得到詳細的說明，然後等待靜息態圖片完成（通常是三四個小時之後）。雖然此時仍**不可進食**任何東西，但可以按照說明服用一些藥品和液體。等待期間，您可以離開中心，而您返回檢查室後，我們會為您採集第二組圖像，採集過程不超過 15 分鐘。

### 靜息態心肌灌注顯像 (鈹)

有時候醫生可能會要求只做一次靜息態鈹測試（即無負荷測試）。某些情況下，在完成初次負荷測試和無負荷測試後，醫生可能會要求安排另外一天再進行一次靜息態鈹測試，以更全面地評估心臟狀況。這種情況下，心臟專科醫生會在您原來的測試結果上添加更多資料。**請不要擔心**，必要時本中心會與您聯繫。

### 討論檢查結果

**請注意，僅可與您的諮詢醫生或家庭醫生討論檢查結果。**



### 心臟診斷中心

(電話) 403 571 8640(英語)

(傳真) 403 571 8658

[totalcardiology.ca](http://totalcardiology.ca)

## 心肌灌注顯像 (MPI/鈹) 負荷測試

### 準備事項

預約：

日期：\_\_\_\_\_

時間：\_\_\_\_\_

本檢查需要進行相應的準備工作。

檢查前，請至少提前三天仔細閱讀本手冊。檢查當日請提前 15 分鐘到達本中心。

如果您的英語表達不暢，請自備翻譯隨行。

懷孕或哺乳期間不能進行此項檢查。

整個檢查過程持續約 5-6 個小時。

兒童不可進入檢查室，也不得單獨在無人照顧的情況下留在等候室。

注意，為完成此項檢查，請務必出示您的亞伯達省醫療保健卡或政府發放的帶照片的證件。如需更改預約時間，請至少提前 24 小時撥打 403-571-8640 更改預約。

如未遵守以下指示，檢查可能需另作安排。

### 準備事項重要說明

#### 測試前 48 小時 (2 天)：

如非醫生另有指示，請**停服**《48 小時藥物清單》中包含的所有藥物。

#### 測試前 24 小時 (1 天)：

**停止**飲用或服用任何含咖啡因和去咖啡因的產品（如咖啡、茶、巧克力、可樂飲品、功能飲料、泰勒諾/咖啡因產品、222、292、一些咳嗽或感冒藥）

如非醫生另有指示，請**停服**《24 小時藥物清單》中包含的所有藥物。

#### 測試前的半夜十二點鐘：

**停止任何飲食**，必要時可飲用少量的水。

#### 測試當天上午：

**停服**降糖藥物，但可以**繼續**注射胰島素。

**繼續**服用《48 小時藥物清單》或《24 小時藥物清單》或《含咖啡因物品清單》中未包含的藥物，如阿司匹林（Aspirin）、氯吡格雷（克拉匹多，Plavix/Clopidogrel）、普拉格雷（Effient/Prasugrel）、替格瑞洛（Brilinta/Ticagrelor）、其他薄血藥，以及哮喘慢性阻塞性肺病、癲癇、帕金森藥物。

請**攜帶**您所服用藥物的資訊，包括藥物名稱和服用劑量。

穿著舒適的運動服裝與運動鞋。不要穿帶鋼圈的胸罩。

請勿塗抹身體油脂或粉末。可以刷牙和使用體香劑。因為有些人對香料比較敏感或有過敏反應，所以請避免使用香水、古龍水、鬍後水或濃香乳液。

請格外仔細地按照下文兩個清單檢查自己的藥物。

如下所示，有些藥物會有一個以上的名稱（商標名/非註冊商標名）。

有些以 **APO**、**NOVO**、**Sandoz**、**Mylan** 等開頭（見藥品盒/袋或藥品包裝盒）的藥品，雖然沒有被列入以下兩個清單，但亦適用於測試準備說明，請加以遵守。

### 48 小時藥物清單

Acebutolol/Monitan 醋丁洛爾  
/Rhotral/Sectral 心施德錠  
Atenolol 壓平樂/Tenormin 天諾敏膜衣錠  
Bisoprolol 康肯膜衣錠/Monocor 心舒康  
膜衣錠  
Carvedilol 心全錠/Coreg 卡維地洛  
MetoprololSR//LopressorSR 酒石酸美托  
洛爾緩釋片  
Nadolol 康加多爾/Corgard 納多洛爾片  
Pindolol/Viskin 巴利心錠  
Sotalol 索他洛爾片/Sotacor 施太可  
Timolol/Blocadren 康舒目  
DiltiazemXC 地爾硫卓緩釋片/TiazacXC  
地爾硫卓緩釋片  
Tadalafil 他達拉非片/Cialis 犀利士  
Vardenafil 樂威壯膜衣錠/Levitra 樂威壯  
Sildenafil / Viagra 威而鋼膜衣錠

### 24 小時藥物清單

Amlodipine/ Norvasc 脈優錠  
Diltiazem 合必爽錠/ Cardizem 凱帝心/ Tiazac 地  
爾硫卓  
Diltiazem CD 地爾硫卓控釋 or SR 緩釋/  
Cardizem CD 凱帝心控釋 or SR 緩釋  
Felodipine 菲迪欣/ Plendil 普心寧錠  
Nicardipine/ Cardene 尼卡地平/ Cardene SR 尼  
卡地平緩釋  
Nifedipine 冠達悅歐樂 / Adalat X/ Adalat PA 硝  
苯地平緩釋片  
Imdur 寬心  
Ismo 愛舒脈  
Isordil SR 麥得炎緩釋膜衣錠  
Isosorbide Dinitrate 易適倍錠  
Isosorbide Mononitrate 冠欣錠  
Nitroglycerine patches 硝酸甘油貼片  
Ivabradine 伊伐布雷定/ Coralan 伊伐布雷定片/  
Procoralan 伊伐布雷定  
Labetolol 湍泰低錠/ Normodyne/ Trandate 拉貝  
洛爾  
Metoprolol/Lopressor 美托洛爾  
Metoprolol XL / Lopressor XL 美托洛爾緩釋/  
Toprol XL 琥珀酸美托洛爾緩釋片 Propranolol /  
Inderal 心律錠  
Twynsta 倍必康平錠  
Verapamil 維拉帕米/ Verapamil SR/ Verapamil  
ER 維拉帕米緩釋  
Isoptin 維拉帕米 / Isoptin SR 維拉帕米緩釋